

产品名称: SD 大鼠骨髓间充质干细胞成软骨诱导分化培养套装 (即用型)
产品货号: RC0110



SD 大鼠骨髓间充质干细胞成软骨诱导分化培养套装 (即用型)

产品简介

本产品是 EnkiLife 专为 SD 大鼠骨髓间充质干细胞研制优化的成软骨诱导分化培养基试剂盒，用于增强 SD 大鼠骨髓间充质干细胞向成软骨细胞方向诱导分化的能力。在库产品均通过生物安全检测 and 产品质量检测，体系稳定有效，现货发送，性价比高。EnkiLife 专业的研发团队可提供最有效的技术指导，保证售后品质。

基本信息

成软骨诱导分化培养基-预混液

试剂盒组分	规格	保存条件	有效期
SD BMSCs Chondrogenic Differentiation Premixed Medium (Contains Inducible Factors)	99 mL	2~8℃，避光	3 个月

成软骨诱导分化培养基——诱导液

试剂盒组分	规格	保存条件	有效期
TGF-β3	1 mL	-20℃	12 个月

NOTE: 每 1 mL 预混液添加 10 μL TGF-β3，混匀即为诱导液，现配现用，12~24h 内使用完毕。TGF-β3 建议分装使用。

其他组分

试剂盒组分	规格	保存条件	有效期
Alcian Blue Solution 阿利辛蓝染色液	5mL	2~8℃，避光	12 个月
0.1.% Gelatin 明胶	15mL	2~8℃	12 个月

质检标准

pH: 7.2~7.4
内毒素含量: < 10 EU/mL
生物安全: 细菌、真菌、支原体检测阴性
质量检测: 诱导测试合格

检验原理

阿利辛蓝广泛用于酸性多糖的染色，如软骨或组织中的糖胺聚糖和细胞分泌的外被多糖的染色等。干细胞在诱导培养基的作用下，会逐渐向软骨细胞方向分化。软骨细胞外具有一层富含蛋白多糖的基质，是成软骨分化的标志物，可被阿利辛蓝染成蓝绿色。

使用说明

成软骨诱导分化操作 (平面诱导)

1. 细胞分化诱导

将对数生长期的细胞消化下来计数, 成软骨诱导分化培养基诱导液重悬细胞, 离心后调整细胞密度密度 $1.0 \sim 2.0 \times 10^7 \text{ cells/mL}$ 。

吸取 $20 \mu\text{L}$ 细胞悬液 (约 $2.0 \sim 4.0 \times 10^5$ 个细胞) 悬滴至 24 孔板中央。置于 37°C , 5% CO_2 培养环境下培养 2~3 h 使细胞贴壁。

2~3 h 后补充 1 mL 成软骨诱导分化培养基诱导液正常培养。每隔 2~3 天换液一次。按照以上换液频率诱导 21~28 天, 并注意观察细胞形态变化。

2. 染色鉴定

2.1 细胞固定

吸去培养基使用适量 $1 \times \text{PBS}$ 清洗一次, 弃去后取适量 4% 中性甲醛溶液覆盖培养器皿底面, 室温固定 30~60 min 后, 弃去固定液再使用 $1 \times \text{PBS}$ 清洗两次。

2.2 阿利辛蓝染色

向清洗干净的诱导孔内加入适量染色液, 避光静置染色 30 min。

吸去阿利辛蓝染色液, 用 $1 \times \text{PBS}$ 清洗两次, 并加入适量 $1 \times \text{PBS}$ 避免细胞干燥。

2.3 诱导评估

显微镜下观察成软骨染色效果, 并进行图像采集和诱导评估。诱导成功时, 软骨组织中的内酸性粘多糖可被阿利辛蓝染成蓝绿色。

成软骨诱导分化操作 (三维培养)

1. 干细胞的准备

将对数生长期的细胞消化下来计数, 取 3×10^5 个细胞转移到 15 mL 离心管中, 250 g 离心 4 min。

弃上清, 加入 0.5 mL 成软骨诱导分化培养基预混液, 重悬细胞, 150 g 离心 5 min。小心弃去上清, 加入 0.5 mL 成软骨诱导分化培养基诱导液, 重悬细胞, 150 g 离心 5 min。

将 15 mL 离心管的管盖稍稍旋开, 放置于 37°C , 5% CO_2 培养环境下培养。

2. 细胞分化诱导

24 h 后观察细胞沉淀形变团聚的情况, 如有明显的变化, 则小心轻柔地拨动管底, 尝试让细胞团脱离管底, 全部浸润在诱导液中。

置于 37°C , 5% CO_2 培养环境下培养约 21 天, 通常每 2 天更换一次新鲜配制的成软骨诱导分化培养基诱导液。注意观察细胞团成球情况及表面光滑度, 决定终止细胞诱导的时间, 并进行染色鉴定。

3. 染色鉴定

3.1 软骨球固定

将软骨球从离心管中转移至 EP 管, 并使用 $1 \times \text{PBS}$ 清洗两次, 最后置于适量的 4% 中性甲醛溶液中。

3.2 石蜡包埋切片

软骨球经石蜡包埋后切片。

3.3 阿利辛蓝染色

将石蜡切片脱蜡和脱水, 使用阿利辛蓝染色液染色 30 min, 用自来水冲洗 2 min, 蒸馏水冲

产品名称：SD 大鼠骨髓间充质干细胞成软骨诱导分化培养套装（即用型）

产品货号：RC0110



洗 1 次。

3.4 诱导评估

显微镜下观察成软骨染色效果，并进行图像采集和诱导评估。诱导成功时，软骨组织中的内酸性粘多糖可被阿利辛蓝染成蓝绿色。

NOTE: 干细胞的成软骨分化水平因细胞类型、细胞供体来源，培养条件、细胞代次、细胞状态和分化时间等因素而异。

注意事项

1. 染色液为独立包装组分，请勿与培养基混用
2. 配制诱导液前，请瞬时离心各管小剂量试剂以免损失，配制后请在有效期内使用完毕。
3. 预混液储存条件：2~8℃，避光；配制后有效期为 3 个月。诱导液现配现用。
4. 本产品仅用于科研实验，不可用于临床治疗。